




# LARWAX

Preparat w formie płynu do rozcieńczania w wodzie.

## Przeznaczony do zwalczania larw i jaj much

w pomieszczeniach inwentarskich (obory, chlewnie, stajnie, przyzmy z obornikiem itp.) oraz na śmietniskach.

### Formy rozwojowe muchy



jaja



larwy



poczwarki



osobnik  
drosły

Zaledwie kilkanaście procent całkowitej populacji much występuje w postaci osobników dorosłych (latających). W związku z tym aby skutecznie zwalczać te uciążliwe owady należy prowadzić walkę nie tylko z formami latającymi ale niszczyć również **inne stadia rozwojowe**. Dlatego środek LARWAX niszcząc **jaja** składane przez samice oraz **larwy** jest bardzo ważnym elementem w strategii skutecznej walki z plagami much.



**Substancja czynna:** N-[[[4-chlorofenylo]amino]karbonylo]-2,6-difluorobenzamid (**diflubenzuron**), 250 g/1l preparatu.

### Sposób działania:

**Preparat LARWAX jest typowym larwicydem:**

zakłóca normalny rozwój larw much prowadząc do ich śmierci. W efekcie nie rozwijają się formy dorosłe owadów.

**Ponadto preparat ma właściwości owicydalne:**

niszczy jaja złożone przez samice much.

**Larwax nie działa na osobniki dorosłe (latające) much.**



### Sposób stosowania i zalecane dawki:

Preparat stosuje się po rozcieńczeniu w wodzie przez podlewanie lub opryskiwanie ściółki, przym z obornikiem, a także innych miejsc, gdzie muchy składają jaja i rozwijają się ich larwy.

**Zalecana dawka:**

- 40 ml preparatu LARWAX w 10 l wody na 10 m<sup>2</sup> opryskiwanej lub podlewanej powierzchni.
- Po wykonaniu zabiegu nie ma potrzeby mieszania preparatu z potraktowanym podłożem.
- Kolejne zabiegi powtarzać co około 3 – 4 tygodnie, przez cały sezon występowania much, stosując preparat w obniżonej dawce: 20 ml preparatu LARWAX / 10 l wody / 10 m<sup>2</sup> powierzchni.

- Preparat LARWAX zaczyna działać po kilku – kilkunastu godzinach od momentu zastosowania, zakłócając rozwój larw i jaj. Zwykle po kilku dniach następuje ich śmierć.
- W celu podniesienia skuteczności zwalczania much oprócz stosowania środka LARWAX powinno się równolegle zwalczać osobniki dorosłe (latające) owadów odpowiednimi insektycydami.
- Na czas wykonywania zabiegu należy wyprowadzić zwierzęta z pomieszczeń inwentarskich. Po wykonaniu zabiegu pomieszczenia można normalnie użytkować.

