








[www.dabest.pl](http://www.dabest.pl)

PRODUKT	JESIEŃ						WIOSNA-LATO		
	PRZED SIEWEM	PODCZAS SIEWU (BBCH 00) <i>w systemie aplikacji ultrazlokalizowanej przy pomocy aplikatora do mikrogranulatu</i>	PO SIEWIE (do 2 dni po siewie) <i>łącznie z herbicydem doglebowym</i>	OD FAZY ROZWINIĘTYCH LIŚCIENI DO 6 LIŚCI (BBCH 10-16) <i>z herbicydem powschodowym</i>	FAZA 4-6 LIŚCI RZEPAKU (BBCH 14-16) <i>z nawozami dolistnymi / fungicydem / insektycydem</i>	Z OSTATNIM ZABIEGIEM DOLISTNYM <i>ok. 2-3 tygodni przed zakończeniem wegetacji przed zimą</i>	WYDŁUŻANIE PĘDU GŁÓWNEGO (BBCH 32-35) <i>razem z fungicydem / nawozami dolistnymi</i>	PRZED KWITNIENIEM, ZIELONY PAŃK (BBCH 51-57) <i>z insektycydem / fungicydem / nawozami dolistnymi</i>	KONIEC KWITNIENIA (BBCH 65-67) <i>razem z insektycydem / fungicydem</i>
 SEMIGATOR 40 starter		10-30 kg/ha							
 FERTIL C-N 40-12,5	150-200 kg/ha plus NPK przed siewem*								
 GERMINATOR SL			10 l/ha						
 NaturalCrop SL					1,0 l/ha	0,5-1,0 l/ha	1,0 l/ha	1,0 l/ha	1,0 l/ha
 fbs MAGNUM					0,5-1,0 l/ha		0,5-1,0 l/ha	0,5-1,0 l/ha	0,5-1,0 l/ha
 Z 20 herbagreen					0,5-1,0 kg/ha	0,5-1,0 kg/ha	0,5-1,0 kg/ha		
 Super 400 SL Algae								1,0-1,5 l/ha	1,0-1,5 l/ha

Dawka i termin zastosowania środków powinny być dostosowane do lokalnych warunków środowiskowych i stanu uprawy, w konsultacji z Doradcą Techniczno-Handlowym NATURALCROP POLAND