







www.dabest.pl

	PRZED SADZENIEM <i>lub podczas sadzenia</i>	PO SADZENIU (do 2 dni) <i>łącznie z przedwzschodowym herbicydem doglebowym</i>	PO WSCHODACH, WZROST CZĘŚCI NADZIEMNYCH (BBCH 23-25)	80% ZWARTYCH MIĘDZYRZĘDZI (BBCH 38-40) <i>początek tuberyzacji</i>	PIERWSZE POJEDYNCZE PĄKI KWIATOWE 1. KWIATOSTANU NA PĘDZIE GŁÓWNYM (BBCH 52-54)	KONIEC KWITNIENIA (BBCH 67-69)
 FERTIL C-N 40-12,5	250-350 kg/ha *					
 GERMINATOR SL		10-15 l/ha				
 NaturalCrop SL			1,0-1,5 l/ha	1,0-1,5 l/ha	1,0-1,5 l/ha	1,0 l/ha
 MAGNUM			0,5 l/ha z każdą aplikacją fungicydu			
 Z 20 herbagreen			0,5-1,0 kg/ha	0,5-1,0 kg/ha	0,5-1,0 kg/ha	0,5-1,0 kg/ha
 Super Algae 400 SL				po 1,0-1,5 l/ha <i>razem z dokarmianiem mikroelementami lub aplikacją fungicydu</i>		

Dawka i termin zastosowania środków powinny być dostosowane do lokalnych warunków środowiskowych i stanu uprawy, w konsultacji z Doradcą Techniczno-Handlowym NATURALCROP POLAND